Piața Alba Iulia Nr. 2, Tronson I,
Bl. I1, sector 3, București

SKINMED CLINIC
Centrul Dermatoestetic

+4 0213 136 433
+4 0311 021 160
+4 0786 356 361

Terapii cu acid hialuronic pentru buze și riduri

Acidul hialuronic este o substanță prezentă în mod natural la nivelul organismului uman și la niveul pielii (derm) în particular.

Ce sunt fillerele dermice?

Fillerele dermice sunt substanțe folosite în tratamentele de estetică facială, ce sunt injectate la nivelul pielii. Sunt substanțe special create pentru a reduce ridurile, pentru a contura sau pentru a crea volum. Au la bază acidul hialuronic, o substanță regăsită în mod natural la nivelul pielii, a cărui producție scade odată cu înaintarea în vârstă.

Ce este acidul hialuronic?

Acidul hialuronic este o moleculă ce se regăsește în mod natural în aproape toate organismele vii. Are proprietatea de a atrage și lega apa, având rol în lubrifierea și absorbția șocului mecanic la nivelul articulațiilor; de asemenea, are un rol important în transportul nutrienților și în menținerea hidratării optime la nivelul pielii.

Cum funcționează fillerele dermice?

Crescând concentrația de acid hialuronic la nivelul pielii, fillerele au proprietatea de a revitaliza, de a reface volumul pielii, atenuând liniile fine și ridurile. Filerelle sunt substanțe injectabile sub formă de gel, acid hialuronic de origine non-animală. Acidul hialuronic are o structură foarte apropiată de cel care există în mod normal în organism, având efect de lungă durată, fără să fie permanent.

Care sunt beneficiile fillerelor?

Injectarea dermică cu fillere reprezintă o metodă facilă de a reduce ridurile, a îmbunătăți textura pielii, pentru un aspect mai tânăr. Rezultatele se văd după o singură ședință de tratament și se mențin pe o perioadă de 6 până la 18 luni. Injectarea de fillere dă un aspect natural, ce nu afectează expresivitatea feței.

Este sigur tratamentul cu fillere dermice?

În Clinica Skinmed folosim acid hialuronic de cea mai bună calitate, cu numeroase studii de siguranță în spate, ce îi garantează siguranța și eficacitatea. Fiind molecule foarte apropiate ca structură acidului hialuronic prezent în mod natural în țesuturi, riscul de reacții alergice este minimizat.

Ce zone putem trata?

Șanțurile nazolabiale, colțurile guri (linii marionetă), ridurile dintre sprâncene (glabelă), buze (volum și contur), pomeți

Ce implică tratamentul cu fillere?

ÎNAINTE: În timpul consultației inițiale, medicul dermatolog va discuta cu dumneavoastră despre ce așteptări aveți de la acest tratament, ce se dorește a se obține, recomandând tratamentul cel mai potrivit pentru dumneavoastră, în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

ÎN TIMPUL PROCEDURII: Fillerul va fi injectat la nivelul pielii folosind un ac fin. Tratamentul durează în general între 15 și 30 de minute, în funcție de zona tratată și cantitatea de acid hialuronic injectată. Acidul hialuronic astfel injectat reface volumul, umple liniile și ridurile, conturează zona tratată, păstrând expresivitatea facială neschimbată.

DUPĂ: Fillerele dermice sunt substanțe biodegradabile, ceea ce înseamnă că vor dispărea în mod normal din țesuturi. Pentru a asigura menținerea rezultatelor, se recomandă o a doua ședință de tratament la 6-12 luni de la ședința inițială. De asemenea, medicul dermatolog va stabili o programare pentru un control la scurt timp după procedură. Imediat după tratament pot apărea reacții locale cum ar fi roșeață, prurit, mici vânătăi, dureri ușoare ale zonei. De obicei, acestea sunt de intensitate mică până la moderată și dispar la scurt timp după injectare.

Cât durează efectele tratamentului?

Unul din avantajele fillerelor dermice este menținerea pe o perioadă lungă de timp a rezultatelor; totuși, acestea nu sunt permanente. De obicei, se recomandă o nouă ședință de tratament la 8-12 luni, în funcție de particularitățile fiecărui pacient (vârstă, stil de viață, tipul de ten etc.).

Există riscuri asociate injectării fillerelor?

Reacțiile alergice sunt extrem de rare. Imediat după injectare pot apărea roșeață, edem, durere, prurit, echimoze, acestea fiind de intensitate mică până la moderată, și dispar în câteva zile până la o săptămâna după procedură. După augmentarea buzelor, poate apărea edem al acestora, ce începe să scadă în intensitate după primele 2 zile.